

Таблица № 2.

1910	Годовая сводка наиболее интересных группъ болѣзней по всѣмъ пунктамъ.																		
	Оспа	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ	Тифъ брюш.	Тифъ сыпн.	Дисентерія	Цынга	Туберкулезъ	Сифилисъ	Malaria	Trachoma.	Проч. за- разныя	Отмороженія	Нервные	Жел.-кишеч- ныя.	Кожныя	% эпидем. заболѣваній	% всѣхъ заразныхъ бол.
Павлоградскій	11	44	85	132	106	189	213	7	90	85	133	121	783	16	397	742	2445	9,6%	18,6%
Полтавскій	47	95	196	327	407	17	107	55	134	175	221	109	653	7	293	1122	1162	9,9%	21,3%
Кійминскій	26	27	22	114	134	94	39	466	44	68	234	59	1176	19	440	1550	1454	7,4%	23,1%
Багагоринскій	34	32	11	25	90	120	155	306	43	74	151	35	124	32	199	840	873	10,3%	26,2%
Макинскій	2	1	4	2	17	7	19	49	5	23	46	17	497	9	173	481	581	4,1%	17,6%
Кокчетавскій (Алексѣевскій)	21	19	13	9	56	65	78	45	74	127	172	90	256	7	115	445	831	7,6%	21,8%
Акмолинскій	14	—	1	18	43	26	19	200	43	61	80	128	205	15	46	919	439	4,3%	20,7%
15 фельдшер. пункт.	78	26	39	103	687	155	280	835	150	187	434	321	1426	34	667	2630	3483	9,2%	19,4%
Итого	233	244	347	730	1540	675	720	1960	585	800	1470	880	5120	140	2330	8720	11270	—	—
Въ % къ годо- вому итогу	0,3%	0,3%	0,5%	1,0%	2,5%	0,9%	1,0%	2,6%	0,8%	1,1%	2,0%	1,3%	6,8%	0,18%	3,1%	11,6%	15,0%	9,3%	20,5%